

MRI 検査の前に必ずお読みください

氏 名	様	※保険証を必ずご持参下さい。		
検査日	月 日 ()	来院時間	時	分
(単純撮影のみ・造影検査実施)		絶食開始時間	時	分

【お願い】

- ・検査開始時間は来院時間の30分後になります。
- ・検査内容により順番が変更されたり、進行状況によって開始時間が予約より遅れることもあります。予めご了承下さい。
- ・腹部の検査及び、検査部位に関わらず**造影検査をお受けになる方は来院5時間半前**から食事を取らないで下さい。ただし飲水については制限はありません。

【安全な検査実施のために】

- ・検査前の絶食が必要な方は処方されている**お薬、インスリン注射の内容を必ず検査3日前までにご連絡下さい。**
- ・特に糖尿病の方は絶食時には、お薬、インスリン注射の調整が必要となります。
- ・お薬手帳をお持ちでFAX送信が可能な方は **〈FAX〉052-764-1725** までFAXをお送り下さい。

【MRI 検査について】

- ・MRIは強い磁気と電波により人体の断面像を撮像して診断を行う検査です。検査時間は約30～60分です。
- ・造影検査の場合は造影剤を静脈内に注射します。

【検査時の注意】 (該当するものがあれば の枠内にチェックして下さい)

・次のような場合 MRI 検査をお受けいただけません。

- ① 心臓ペースメーカー ② 人工内耳 ③ 圧可変式バルブシャント付き V-Pシャント ④ 人工心臓弁

・次のような方は MRI 検査をお受けいただけませんので、必ず事前にお知らせ下さい。

- ① 心臓疾患などで真皮浸透貼付剤（ニトロダーム）を使用中の方。 ② 閉所恐怖症の方。 ③ 妊娠中の方。
④ 脳動脈瘤クリップ、冠動脈ステントにて治療後の方。 ⑤ 磁石を利用したインプラントを装着されている方。
⑥ 刺青やアートメイクをされている方。画像の劣化や軽い火傷を起こす恐れがあります。 ⑦ その他の金属

・下記を使用中の場合、検査の妨げ（発熱・故障の原因）になりますので、事前に取り外し検査室内に持込まないで下さい。

- ① 貴金属類：時計、指輪、ネックレス、付け爪、イヤリング、ヘアピン、ベルトなど。
② メガネ、コンタクトレンズ、補聴器、入れ歯、カイロ、エレキバンなど。
③ ブラジャーやボディースーツなど金属のついた下着。
④ キャッシュカードやテレホンカードなどの磁気カードは使用ができなくなります。
⑤ 化粧品（マニキュア、ジェルネイルを含む）は画像の劣化や軽い火傷を起こす恐れがありますので、必ず検査前に落として下さい。

【造影剤について】

・次のような方は原則として造影検査をお受けいただけません。必ずお申し出下さい。

- ① 気管支喘息の方 ② 腎機能低下を指摘されている方 ③ 重度のアレルギーをお持ちの方
④ 今まで造影剤による副作用を起こした事がある方

- ・造影剤は病巣の有無や性質、範囲等をより詳細に評価するために用いられます。
- ・造影剤を注入するときに血管外に漏れる可能性があります。その際、局所が腫脹し痛みを伴うこともありますが、通常、時間の経過とともに吸収されます。まれに治療が必要な場合もあります。
- ・検査当日、検査担当医の判断により、造影検査を中止する場合があります。
- ・造影剤の使用により、頻度は高くありませんが、体調や体質によってまれに副作用が起こることがあります。
- ・副作用の種類には以下のようなものがあります。

軽度の副作用（1%以下）：嘔気、かゆみ、発疹、咳、頭痛、咽喉頭（のど）違和感、動悸

重度の副作用（非常にまれ）：呼吸困難、ぜんそく発作、血圧低下、意識障害、死亡（10万人に1人）

※上記チェックボックスに1つでも該当する項目がございましたら、下記までご連絡下さい。

検査は予約制になっております。予約時間に遅れる場合やご来院できない場合は必ずご連絡下さい。

東名古屋画像診断クリニック：052-764-1714

CT検査の前に必ずお読みください

氏名	様	※保険証を必ずご持参下さい。		
検査日	月	日 ()	来院時間	時 分
(単純撮影のみ・造影検査実施)			絶食開始時間	時 分

【お願い】

- ・検査開始時間は来院時間の30分後になります。
- ・検査内容により順番が変更されたり、進行状況によって開始時間が予約より遅れることもあります。予めご了承下さい。
- ・腹部の検査及び、検査部位に関わらず**造影検査をお受けになる方は来院5時間半前**から食事を取らないで下さい。ただし飲水については制限はありません。

【安全な検査実施のために】

- ・検査前の絶食が必要な方は処方されている**お薬、インスリン注射の内容を必ず検査3日前までにご連絡下さい。**
- ・特に糖尿病の方は絶食時には、お薬、インスリン注射の調整が必要となります。
- ・お薬手帳をお持ちでFAX送信が可能な方は〈FAX〉052-764-1725までFAXをお送り下さい。

【CT検査について】

- ・CTとはX線を用いて人体の目的部位の断面像を撮影して診断を行う検査です。所要時間は10～20分です。
- ・検査内容によってヨード造影剤を注射して撮影（造影検査）することがあります。

【検査時の注意】（該当するものがあれば の枠内にチェックして下さい）

- ・次のような方はCT検査をお受けいただけない場合がありますので、必ず事前にお申し出下さい。

心臓ペースメーカーを装着している 妊娠中もしくは妊娠の可能性がある

【ヨード造影剤検査に関して】

- ・次のような方は原則として造影検査をお受けいただけません。必ずお申し出下さい。

気管支喘息 腎機能低下 造影剤アレルギー 食べ物や薬等によるアレルギー 甲状腺疾患

- ・造影剤はCT検査で病巣の有無や性質、範囲等をより詳細に評価するために用いられます。
- ・造影剤の使用により、頻度は高くありませんが、体調や体質によって副作用が起こることがあります。
- ・副作用の種類には以下のものがあります。
軽度の副作用（4%以下） : 嘔気、嘔吐、じんましん等
重度の副作用（非常にまれ） : 呼吸困難、血圧低下、腎不全、意識障害、死亡（約10～20万人に1人）
- ・万が一、重度の副作用が起こった場合には他医療機関へご紹介する場合があります。
- ・造影剤を注射する際には体が熱く感じることがありますが、一過性であり心配ありません。
- ・造影剤を注入するときに血管外に漏れる可能性があります。注射部位が腫脹し、痛みを伴うこともありますが、通常、時間の経過に従い吸収されます。まれに治療が必要な場合があります。
- ・造影検査がなんらかの理由で不適切と考えられる場合は検査担当者の判断により造影を施行しないことがあります。
- ・造影剤は尿から排泄されますので水分制限のない方は検査後に水分を多めにとってください。

【糖尿病をお持ちの方へ】

一部の糖尿病治療薬とヨード造影剤と併用した場合、重篤な副作用を発症する恐れがあるとして、禁忌事項に定められました。下記のお薬を服用中の方は造影検査を実施できませんので、予めご了承下さい。


- ・ジベトス錠 ・ジベトン錠 ・塩酸ブルホルミン錠 ・グリコラン錠
- ・メデット錠 ・メルピン錠 ・ネルビス錠 ・メトリオン錠

※上記チェックボックスに1つでも該当する項目がございましたら、下記までご連絡下さい。

検査は予約制になっております。予約時間に遅れる場合やご来院できない場合は必ずご連絡下さい。

東名古屋画像診断クリニック：052-764-1714

東名古屋画像診断クリニックまでの交通マップ



・地下鉄をご利用される場合 「自由ヶ丘」2番出口 ⇒ 徒歩7分

○名古屋・栄から

所要時間	「名古屋」	⇒	「自由ヶ丘」
------	-------	---	--------

 約30分

○大曾根・栄から

所要時間	「大曾根」	⇒	「自由ヶ丘」
------	-------	---	--------

 約20分

○金山から

所要時間	「金山」	⇒	「自由ヶ丘」
------	------	---	--------

 約35分

・市バスをご利用される場合 「千種台中学校」から 徒歩4分

○名古屋駅から

所要時間	「名古屋」	⇒	「自由ヶ丘」
------	-------	---	--------

 約40分

○星ヶ丘から

所要時間	「星ヶ丘」	⇒	「自由ヶ丘」
------	-------	---	--------

 約20分

・お車をご利用される場合

○本山交差点から北へ5分、平和公園の北西

※駐車台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

※愛知県がんセンター中央病院の駐車場はご利用できませんので、ご注意ください。

医療法人 名古屋放射線診断財団

東名古屋画像診断クリニック

〒464-0044 名古屋市千種区自由ヶ丘3-4-26

電話番号(052)764-1714 FAX番号(052)764-1725